

BARNVACCINATIONER GES ENLIGT NEDANSTÅENDE TABELL

Ålder	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5-6 år	6-8 år	10 år	10-12 år	12 år	14-16 år
Vaccin mot	Allmän del – Rekommenderas till alla barn									
Difteri, Stelkramp, Kikhosta	I	II	III		IV (barn födda från 2002)		IV (barn födda t.o.m 2001)			V (barn födda från 2002)
Polio	I	II	III		IV					
Hib (Haemophilus influenzae typ b)	I	II	III							
Pneumokocker	I	II	III							
Mässling, Påssjuka, Röda hund				I		II (barn födda från 2002)			II (barn födda t.o.m 2001)	
HPV (Humant papillomvirus)								I+II+III		
	Riktad del – Rekommenderas till barn med ökad risk									
Tuberkulos	Vaccinet ges vanligen med en dos efter 6 månaders ålder till barn med ökad risk för tuberkulossmitta. Det kan dock ges tidigare om barnet ska vistas i miljö med pågående smittspridning.									
Hepatit B	Vaccinet ges till barn med ökad risk för hepatit B. Vanligen ges det vid tre tillfällen, antingen tillsammans med övriga vacciner under spädbarnsåret eller enligt ett separat tidsschema. Nyfödda till mödrar med hepatit B vaccineras enligt särskild rutin.									

Tabellen uppdaterades senast i februari 2010

